

犬狂犬病灭活疫苗(犬用)

请仔细阅读说明，严禁将疫苗用于其他用途。

警告语：本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。临床使用时应权衡利弊。

【产品规格】 每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

【产品性状】

本品为无色或淡黄色澄明液体，可带乳光。

本品为无色或淡黄色澄明液体，可带乳光。

【产品组成】

本品由灭活狂犬病病毒、佐剂、稳定剂、防腐剂等组成。

本品由灭活狂犬病病毒、佐剂、稳定剂、防腐剂等组成。

【产品包装】

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

【产品有效期】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品贮存】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品运输】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品使用】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品不良反应】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品禁忌】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品注意事项】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品规格】

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

【产品包装】

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

每瓶含疫苗总剂量为200µl/瓶，疫苗总剂量为0.5ml/瓶。

【产品有效期】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品贮存】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品运输】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品使用】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品不良反应】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品禁忌】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【产品注意事项】

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

本品在2-8℃避光保存，有效期为12个月。

【禁忌】

1. 对本品或任何成分有过敏史者禁用。
2. 有持IgA抗体的选择性IgA缺乏者禁用。
3. 本品中不含任何防腐剂及抗生素。
4. 本品中不含任何动物源性成分。
5. 本品中不含任何卵蛋白成分。
6. 本品中不含任何乳糖成分。
7. 本品中不含任何明胶成分。
8. 本品中不含任何动物源性成分。
9. 本品中不含任何卵蛋白成分。
10. 本品中不含任何乳糖成分。
11. 本品中不含任何明胶成分。

【药物相互作用】

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

【注意事项】

1. 本品不得用作静脉注射。
2. 本品肌肉注射不需做过敏试验。

【药物过

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

【包装】

每瓶含0.5ml，每盒含10瓶。

【有效期】

36个月

【执行标准】

GB 19086-2008

【批准文号】

京准药字(2008)第00005号

【药品上市许可持有人】

博雅生物制药有限公司

【生产企业】

博雅生物制药有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇史各庄大街100号

邮政编码：050200

电话号码：0311-83935518

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

【不良反应】

本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。
本品与任何疫苗同时使用时，应间隔至少14天。

博雅生物制药有限公司
地址：北京市昌平区北七家镇史各庄大街100号
邮政编码：050200
电话号码：0311-83935518